

Tiobarbital Inyectable

(Tiopental sódico)

Anestésico general intravenoso de acción ultracorta.



- Calidad
- Seguridad
- Eficacia

Tiobarbital Inyectable

(Tiopental sódico)

Composición

4RUR gZ] UV"! ^]çT _eV_V+EZ aV_eR] dMUT ! i& X
4RUR gZ] UV#! ^]çT _eV_V+EZ aV_eR] dMUT " X

Especies de destino

AVcè dj XRe` d

Indicaciones

ARcR]R_Z_UF TTZ¼ UV]R_R_VdeVdR XV_VcR]Z4` ^`
R_Vde³dZT` è eR] V_Z_eVcgV_TZ _Vd bf ZÁcXZTRd
T æRdçT` ^` df a]V^ V_e` UV` èc` dR_Vde³dZT` dj
aRcR ac` Uf TZc YZa`_ dZd Uf cR_eV]R_R_VdeVdR
Vbf Z]ScRUR T` _` èc` dRXV_eVcçeR]VdT` ^`
R_R]X³dZT` d` ^ Z cV]R]R_eVcZ
Df d acZ_TZaR]Vd_Z_UZTRTZ` _Vd d` _]Rd_Z_eVcgV_TZ` _Vd
bf ZÁcXZTRd UV T` æR Uf cRTZ¼ j VcbVTR]` ^ V_eV]R
Z_UF TTZ¼ UV]R_R_VdeVdR XV_VcR] aRcR df a` dèVcZ c
^ R_eV_Z` ZV_e` T` _ R_Vde³dZT` dg`]«e]Vd/9R]` eR` ç
:d V]f` cR` ç? #@çVeT` Z]ZfZ

Preparación


DV adVaRcR]R_UZd]f TZ¼ V_V] ac` aZ` gZ]çUV Wc` ^ R
bf V]R d`]f TZ¼ dVf]eR_eV dVR UM] & . çVd UVTZçR³ RUZç
"! TT UV RXf R_Vde³cZ] aRcR Z_j VTeRS]Vd]R adVd_eRTZ¼
UV! ç X j #! TT UV aRcR]R adVd_eRTZ¼ UV" XZ
-R d`]f TZ¼ UMSV adVaRcRdV_Z` ^ VUZReR` ^ V_eV R_eV d UV
df RU` Z_ZbcRTZ¼ j af VUV f eZ]ZkRcd Uf cR_eV f`
aVcZ U` UV \$ Y` cRd UVcbf³d UV df cVT` _cbZf TZ¼ Z
5f cR_eV V] aVcZ U` bf V aVc` R_VTV cVT` _cbZf ZUR UMSV
^ R_eV_Vcd V] gZ] dMUTXVdRU` j SZV_TVcçRU` Z

Vía de administración

DV RU` Z_ZbcR a` cg R_Z_eRgV`_ dRZ

Dosis de inducción

AVcè d+UV"! R #& ^ XZ X a` cg R_Z_eRgV`_ dRZçVd UVTZç
UV! ç R! ç TTZ X
8Re` d+UV & R"! ^ XZ X a` cg R_Z_eRgV`_ dRZçVd UVTZç
UV! ç R! ç TTZ X
4` ^` cV]R XV_VcR]çdV RU` Z_ZbcR UV" Z\$ R" Z# UM]
g`]f ^ V` TR]Tf]RU` V` Wc` ^ R UV S`] Z_ZR] j dV
^ R_eV_VRU` Z_ZbcR_U` V] dVdè` R VVTe` Z





Precauciones

Precauciones de uso: Evitar la ingestión de alimentos, especialmente carne cruda, y evitar el contacto con otros animales enfermos. Mantener al animal limpio y seco. Evitar el estrés y el ejercicio excesivo. Si se observan síntomas de intoxicación, suspender inmediatamente el tratamiento y acudir al veterinario.

Incompatibilidades

El cloruro de amonio no debe administrarse simultáneamente con otros medicamentos que contengan amoníaco. Evitar el uso de productos que contengan alcohol. El medicamento debe guardarse en un lugar fresco y seco, protegido de la luz y del calor.



Código Braun	Nº Registro	Denominación	Unidad Venta
213124	123456789	Ampicilina 1 g Braun	1 vial
213124	123456789	Ampicilina 1 g Braun	1 vial

B | BRAUN

SHARING EXPERTISE

B. Braun VetCare SA

4edRZUV EVcRcbRç" #"
!) " "" CFS
/3RcTVj _Rfi

Servicio Atención Clientes

EVj³W_` *! # %& %& !"
EVjWw *! # %& %& !"
M ^ Rq+Rv_TZ _TjZ_eVjVeTRcV1 SScrf_žr ^
hhh ŽScrf_! gvETRcVž/d